

## INFORMATION

RAT UND HILFE  
FÜR IHR KIND

# Verstopfung

## Obstipation



---

# URSACHEN

**Im Kindesalter kommt es relativ häufig zu Verstopfungerscheinungen. Sind Kinder verstopft, braucht es viel Geduld und eine konsequente Therapie, um zu einem normalen Stuhlgang zurückzufinden.**

---

## DER NORMALE STUHLGANG

- » Gestillte Säuglinge (ab der 4. Lebenswoche):  
10 x pro Tag bis 1 x alle 10 Tage
- » Fläschchenernährte Säuglinge: ca. alle 1–2 Tage
- » Kleinkinder, Kinder, Erwachsene: ca. alle 2 Tage

---

## VERSTOPFUNG (OBSTIPATION)

- » Der Säugling/das Kind hat immer wieder Bauchschmerzen im Zusammenhang mit dem Stuhlgang.
- » Absetzen von kleinen harten Kotballen, teilweise Entleerung von weichem Stuhlgang (durchfallartig) vor- oder nachher möglich
- » Kinder, die zuvor sauber waren, haben plötzlich wieder Stuhlsuren in der Unterwäsche oder unfreiwilligen Stuhlabgang.
- » Blut am WC-Papier oder helle Blutauflagerungen auf Stuhlgang durch kleine Schleimhautrisse am Anus (Rhagaden) möglich
- » Selten: Erbrechen

---

## URSACHEN

Durch verschiedene Faktoren (Umstellung der Ernährung, Infektionskrankheiten, Fehlernährung, Reisen, Unlust auf die Toilette zu gehen) kann der Stuhlgang fester werden und das Kind macht die Erfahrung, dass der Stuhlgang schmerzhaft ist.

Somit beginnt es willkürlich oder unwillkürlich, den Stuhl zurückzuhalten und nicht auf die Toilette zu gehen. Damit wird der Stuhl noch härter und wird dem Kind erneut Schmerzen bereiten, wenn es Stuhlgang absetzt.

Es entsteht ein Teufelskreis. Wenn dieser Teufelskreis nicht unterbrochen wird, häuft das Kind immer mehr Stuhl im Dickdarm an. Es kommt zum Überlaufen: das Kind hat paradoxerweise plötzlich Durchfall, kann unwillkürlich Stuhl verlieren oder Stuhlstreifen (Stuhlschmierer) in der Unterwäsche haben. Spätestens dann sollte das Problem abgeklärt und konsequent behandelt werden.

**Verschiedene Einflüsse können sich negativ auf das Stuhlverhalten ihres Kindes auswirken (wie zum Beispiel Fehlernährung oder wenig Bewegung).**

Diese Faktoren sind aber nie alleinige Ursache einer Verstopfung. Ernsthafte Krankheiten als Ursache für eine Verstopfung sind selten. Manchmal können gewisse Medikamente zu einer gestörten Stuhlentleerung führen (Eisenpräparate). Es gibt vereinzelt Kinder, bei denen der Enddarm nicht richtig von Nerven versorgt ist (Morbus Hirschsprung). Diese Kinder leiden ab der Geburt unter Verstopfung.

## BEHANDLUNG

- » **Einläufe:** Manchmal müssen die harten Stuhlballen durch einen Einlauf aus dem Enddarm geholt werden. Dies sollte aber immer in Absprache mit einem Arzt geschehen und darf nicht als alleinige Maßnahme gegen die Verstopfung eingesetzt werden.
- » **Laxantien (Abführmittel):** Oft muss man den Teufelskreis Verstopfung durch Medikamente unterbrechen. Diese Abführmittel weichen den Stuhl auf und ermöglichen somit einen schmerzfreien Stuhlgang. Es entsteht keine Abhängigkeit, auch wenn Laxantien über eine lange Zeit regelmäßig eingenommen werden.
- » **Ernährung:** Altersentsprechende, gesunde, ausgewogene Ernährung
- » **„Toilettentraining“:** Nach jedem Essen kommt es durch die Aufnahme der Nahrung zu einer Aktivierung des Darmes und möglicherweise zur Darmentleerung (gastrokolischer Reflex). Deshalb sollte das Kind 1–3 x pro Tag nach dem Essen auf die Toilette gesetzt werden, um diesen Reflex zu nutzen. Es ist wichtig, dass auf eine gute Position des Kindes geachtet wird (Fuß-Schemel zum Aufstützen der Beine, damit das Kind nicht in der WC-Schüssel hängt und damit es besser die Bauchpresse einsetzen kann).



**Unbedingt vermeiden:  
 Stimulieren/Manipulieren Sie am  
 Darmausgang nicht mit dem  
 Fieberthermometer, denn das kann  
 zu Verletzungen führen.**

## WANN SOLLTEN SIE EINE ÄRZTIN/ EINEN ARZT AUFSUCHEN?

- » Wenn Ihr Kind über anhaltende, immer stärker werdende Bauchschmerzen klagt.
- » Wenn Ihr Kind massiven Durchfall hat (mit/ohne Erbrechen).
- » Wenn Ihr Kind seit Geburt oder seit langer Zeit unter Verstopfung leidet.
- » Wenn Ihr Kind immer wieder Blut- oder Schleimbemengungen auf dem Stuhlgang hat.
- » Wenn Ihr Kind nicht mehr an Gewicht zunimmt.
- » Wenn Sie sich aus einem sonstigen Grund Sorgen um Ihr Kind machen.